



VILLA DONATELLO

PIÙ SPAZIO ALLA TUA SALUTE

**ALLUCE VALGO:
SCOPRI LE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE
PER RECUPERARE LA SALUTE DEI TUOI PIEDI**

A cura del

Dott. Michele Risi

■ Alluce valgo



L'alluce valgo è una patologia molto diffusa, in particolare nelle donne, che tende a comparire in età matura.



■ Alluce valgo



È caratterizzata da deviazione dell'alluce verso le altre dita del piede ed è associata alla formazione di una prominenza ossea sul lato interno del piede.



■ Alluce valgo



Può causare dolore, soprattutto nel camminare o nell'indossare calzature strette e/o con tacchi alti.

Il dolore in genere si localizza a livello della sporgenza ossea.



■ Alluce valgo



Nei casi più gravi può causare un cambiamento della forma del piede, evidenziato da un progressivo deformarsi delle scarpe che possono risultare sempre più scomode e difficili da indossare.



Alluce valgo e piede piatto




L'alluce valgo può essere correlato alla presenza di un piede piatto con il cedimento progressivo del piede verso il basso.



Alluce valgo, dita a martello e metatarsalgia



Nelle forme più avanzate può a sua volta associarsi a deformità delle altre dita del piede (ad es. dita a martello) o a metatarsalgia con la presenza di callosità dolenti sotto la pianta del piede.



Alluce valgo: radiografie



La diagnosi si basa sulla valutazione clinica dello specialista ortopedico e sull'esame radiografico di entrambi i piedi sotto carico.



La chirurgia percutanea mininvasiva dell'alluce valgo



L'intervento si rende necessario nei casi di dolore e difficoltà di deambulazione che non rispondono alle cure mediche convenzionali.

L'obiettivo dell'intervento è eliminare il dolore e correggere la deformità.





La chirurgia percutanea mininvasiva in anestesia locale

L'intervento percutaneo mininvasivo con tecnica PBS si esegue in anestesia locale, addormentando quindi solo il piede.

MD




La chirurgia percutanea mininvasiva dell'alluce valgo

Si utilizzano mini frese dedicate che consentono di correggere la deformità agendo direttamente sull'osso.



È necessario utilizzare un apposito apparecchio chiamato fluoroscopio che consente al chirurgo di visualizzare, attraverso un monitor, in tempo reale i gesti chirurgici.



La chirurgia percutanea mininvasiva dell'alluce valgo



La tecnica percutanea mininvasiva offre diversi vantaggi: minuscole incisioni cutanee, tagli dell'osso per consentire un'ottima correzione del valgismo senza impiegare sistemi di fissazione quali viti, placche o fili metallici.



Bendaggio post operatorio e carico immediato sul piede



**Dopo 5 settimane:
rimozione bendaggio
e uso di calzature
sportive**



Risultati dopo l'operazione

Prima



Dopo 90 giorni



Prima



Dopo 90 giorni




Risultati dopo l'operazione

Prima



Dopo 90 giorni





VILLA DONATELLO

PIÙ SPAZIO ALLA TUA SALUTE



PIÙ SPAZIO ALLA TUA SALUTE